

Link do produktu: <https://sadyiogrody.pl/klon-na-pniu-jesionolistny-p-1294.html>

## Klon na pniu Jesionolistny



|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Cena              | <b>79,00 zł</b>             |
| Czas wysyłki      | <b>10 dni</b>               |
| Kod producenta    | <b>1728</b>                 |
| Wiek sadzonki     | <b>2 lata</b>               |
| Czas wysyłki      | <b>od 3-5 dni roboczych</b> |
| Wysokość sadzonki | <b>130-160cm</b>            |
| Forma sprzedaży   | <b>Doniczka Co4</b>         |
| Podkładka         | -                           |

### Opis produktu

#### Acer na pniu "Jesionolistny "

Szybko rosnące drzewo z długimi, często zwisającymi gałęziami. Pnie często krzywe, poskręcane, z licznymi naroślami. W Polsce dorasta do wysokości 10-15 m, w naturalnych siedliskach nawet do 20 m. Młode pędy gładkie, nagie, o barwie jasnozielonej lub fioletowej. Owoce to wydłużone orzeszki ze skrzydełkiem. Drzewo dekoracyjne głównie ze względu na malowniczy, rozłożysty pokrój oraz jasnożółte ubarwienie jesienne. Niezbędne w założeniach naturalistycznych. Drzewo mało wymagające, tolerancyjne w stosunku do gleby i światła, bardzo odporne na suszę, odporne na mrozy.

#### Podstawowe informacje:

Barwa kwiatów: ----  
Barwa liści: zielona/żółta  
Okres kwitnienia: ----  
Okres owocowania: ----  
Stanowisko: słoneczne  
Wymagania: najlepiej żyzna, umiarkowanie wilgotna gleba  
Wysokość: ok. 3m

#### Uprawa i ciekawostki

-Klon na pniu Jesionolistny niezbyt ekspansywny i nie zajmuje tyle miejsca co forma pierwotna  
- mało wymagający , całkowicie mrozoodporny, toleruje zanieczyszczone środowisko

- 
- Dobrze znosi zarówno suszę jak i wilgoć
  - Można go przycinać kontrolując wzrost. Cięcie wykonać wczesną wiosną.

#### **Porady cięcia klonu**

\*Zalecany termin cięcia: od początku czerwca do początku lipca

\*Roślina ta przycięta wczesną wiosną "płacze" - z ran po cięciu wyciekają soki, które osłabiają roślinę. Dlatego najlepiej cięcie tych roślin przeprowadzić po okresie pędzenia soków, czyli po wypuszczeniu pierwszych liści. Większe drzewa lepiej ciąć po całkowitym rozwoju liści.

\*Drugim alternatywnym terminem cięcia jest środek zimy (często właśnie ten termin jest podawany w literaturze) - najpóźniej do końca stycznia, ewentualnie początku lutego - w suche bezmroźne dni.

\*Skracamy wszystkie nadmiernie wybujałe pędy oraz te wyrastające poza pożądany przez nas kontur korony. Wszystkie pędy ścinamy tuż nad rozgałęzieniem albo tuż nad pąkiem skierowanym na zewnątrz korony.

Cięciu sanitarnemu podlegają:

gałęzie rosnące zbyt nisko,

gałęzie krzyżujące się,

wilki,

\*Usuń wszystkie martwe, suche i chore gałęzie. ostry korzeniowe.