



## Śliwa Duo Mezo Brzoskwiniowa - Węgierka

Cena	<b>69,99 zł</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>1702</b>
Wiek sadzonki	<b>2 lata</b>
Czas wysyłki	<b>od 3-5 dni roboczych</b>
Wysokość sadzonki	<b>130-150cm</b>
Forma sprzedaży	<b>Doniczka Co4</b>
Podkładka	-

### Opis produktu

#### **Prunus Duo Mezo "Brzoskwiniowa - Węgierka"**

##### **Prunus 'Brzoskwiniowa'**

Prawdopodobnie jest to odmiana angielska. Rodzi duże owoce których skórka jest różowo-żółta, pokryta nieregularnym ciemno czerwonym rumieńcem i jasno-fioletowym nalotem oraz licznymi cętkami. Miąższ jest smaczny, soczysty i w smaku słodki. Owoce tej odmiany dojrzewają na początku sierpnia. Jest to odmiana deserowa.

##### **Prunus 'Węgierka Zwykła'**

Drzewo rośnie średnio silnie i rodzi średniej wielkości lub małe, w kształcie lekko wydłużone, ciemnofioletowe owoce, pokryte jasnym nalotem, z bardzo smacznym, dość soczystym miąższem, dobrze oddzielającym się od pestki. Owoce te dojrzewają w połowie sierpnia. Jest dostatecznie wytrzymałe na mróz, ale wyjątkowo wrażliwe na szarą.

#### **Podstawowe informacje:**

Barwa kwiatów: biała  
Barwa liści: zielone  
Okres kwitnienia: marzec/kwiecień  
Okres owocowania: sierpień/sierpień  
Stanowisko: słoneczne  
Wymagania: najlepiej żyzna gleba o odczynie obojętnym  
Wysokość: ok. 2,2m

### **Uprawa i ciekawostki**

- - najlepiej rosną na glebach ciepłych, wilgotnych i przewiewnych, lekko gliniastych lub piaszczysto-gliniastych, o pH lekko zbliżonym do obojętnego (około 6,8-7,0)
- aby uzyskać wysoką zawartość cukru w owocach należy drzewa sadzić w pełnym słońcu
- przed umieszczeniem sadzonki w gruncie warto przyciąć jej korzenie i zamoczyć je w wodzie

#### **Dedykowane środki ochrony dla Śliwy**

- Torbiel śliw- Sylit 65WG
- Brunatna zgnilizna- Riza 250EW
- Owocówka śliwkóweczka- Calypso 480SC

#### **Porady cięcia drzewek kolumnowych, duo i mezo**

- \*Mimo ograniczonego przyrostu, tak jak inne wymagają cięcia, aby zachować swój kształt i rodzić owoce.
- \*Po przycinaniu na drzewie powstają rany, tworzące furtkę dla grzybów i bakterii, zatem należy ciąć w odpowiednim terminie i umiejętnie zabezpieczać miejsca cięcia.
- \*pierwsze cięcie formujące wykonujemy na wiosnę.