



## Śliwa Duo Mezo Opal - Stanley

Cena	<b>69,99 zł</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>1703</b>
Wiek sadzonki	<b>2 lata</b>
Czas wysyłki	<b>od 3-5 dni roboczych</b>
Wysokość sadzonki	<b>130-150cm</b>
Forma sprzedaży	<b>Doniczka Co4</b>
Podkładka	-

### Opis produktu

#### **Prunus Duo Mezo "Opal - Stanley"**

##### **Prunus 'Opal'**

Jest to szwedzka odmiana śliwy i jej drzewo rośnie średnio silnie. Skórka owocu początkowo ma żółto-zieloną barwę, a w pełnej dojrzałości żółtą, z fioletowo-niebieskim rumieńcem. Ich miąższ jest smaczny, słodki i bardzo łatwo odchodzący od pestki. Owoce dojrzewają na początku września. Jest to deserowa odmiana, nadająca się również do przetworów.

##### **Prunus 'Stanley'**

Jest to odmiana amerykańska. Skórka tych owoców jest ciemno-granatowej barwy, z silnym niebiesko-fioletowym nalotem, bardzo drobnymi jasno-brązowymi przetchlinkami. Owoce te osiągną dojrzałość zbiorczą w pierwszej połowie września. Jest to odmiana deserowa ale doskonała również na susz i kompoty a także powidła.

#### **Podstawowe informacje:**

Barwa kwiatów: biała  
Barwa liści: zielone  
Okres kwitnienia: marzec/kwiecień  
Okres owocowania: sierpień/sierpień  
Stanowisko: słoneczne  
Wymagania: najlepiej żyzna gleba o odczynie obojętnym  
Wysokość: ok. 2,2m

## Uprawa i ciekawostki

- - najlepiej rosną na glebach ciepłych, wilgotnych i przewiewnych, lekko gliniastych lub piaszczysto-gliniastych, o pH lekko zbliżonym do obojętnego (około 6,8-7,0)
- aby uzyskać wysoką zawartość cukru w owocach należy drzewa sadzić w pełnym słońcu
- przed umieszczeniem sadzonki w gruncie warto przyciąć jej korzenie i zamoczyć je w wodzie

### Dedykowane środki ochrony dla Śliwy

- Torbiel śliw- Sylit 65WG
- Brunatna zgnilizna- Riza 250EW
- Owocówka śliwkóweczka- Calypso 480SC

### Porady cięcia drzewek kolumnowych, duo i mezo

- \*Mimo ograniczonego przyrostu, tak jak inne wymagają cięcia, aby zachować swój kształt i rodzić owoce.
- \*Po przycinaniu na drzewie powstają rany, tworzące furtkę dla grzybów i bakterii, zatem należy ciąć w odpowiednim terminie i umiejętnie zabezpieczać miejsca cięcia.

\*pierwsze cięcie formujące wykonujemy na wiosnę.