

Link do produktu: <https://sadyiogrody.pl/sliwa-duo-mezo-ulena-althana-p-1274.html>



## Śliwa Duo Mezo Ulena - Althana

Cena	<b>69,99 zł</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>
Kod producenta	<b>1704</b>
Wiek sadzonki	<b>2 lata</b>
Czas wysyłki	<b>od 3-5 dni roboczych</b>
Wysokość sadzonki	<b>130-150cm</b>
Forma sprzedaży	<b>Doniczka Co4</b>
Podkładka	-

### Opis produktu

#### **Prunus Duo Mezo "Ulena - Althana"**

##### **Prunus 'Ulena'**

Drzewo rośnie silnie i rodzi duże, a nawet bardzo duże owoce. Ich skórka jest złocisto-żółtego koloru i pokryta jest jasnym nalotem, natomiast miąższ jest bardzo smaczny i słabo odchodzi od pestki. Owoce te dojrzewają na początku sierpnia. Jest to jedna z najpopularniejszych odmian deserowych.

##### **Prunus 'Althana'**

Drzewo rośnie średnio silnie i rodzi duże, w kształcie kuliste owoce. Skórka tych owoców jest z ciemnofioletowym rumieńcem, pokrytym silnym niebieskofioletowym nalotem, o wyjątkowo smacznym miąższu, który dobrze odchodzi od pestki. Owoce dojrzewają pod koniec sierpnia i są jedne z najsmaczniejszych Renklod.

#### **Podstawowe informacje:**

Barwa kwiatów: biała  
Barwa liści: zielone  
Okres kwitnienia: kwiecień/kwiecień  
Okres owocowania: sierpień/sierpień  
Stanowisko: słoneczne  
Wymagania: najlepiej żyzna gleba o odczynie obojętnym  
Wysokość: ok. 2,2m

## Uprawa i ciekawostki

- - najlepiej rosną na glebach ciepłych, wilgotnych i przewiewnych, lekko gliniastych lub piaszczysto-gliniastych, o pH lekko zbliżonym do obojętnego (około 6,8-7,0)
- aby uzyskać wysoką zawartość cukru w owocach należy drzewa sadzić w pełnym słońcu
- przed umieszczeniem sadzonki w gruncie warto przyciąć jej korzenie i zamoczyć je w wodzie

### Dedykowane środki ochrony dla Śliwy

- Torbiel śliw- Sylit 65WG
- Brunatna zgnilizna- Riza 250EW
- Owocówka śliwkóweczka- Calypso 480SC

### Porady cięcia drzewek kolumnowych, duo i mezo

- \*Mimo ograniczonego przyrostu, tak jak inne wymagają cięcia, aby zachować swój kształt i rodić owoce.
- \*Po przycinaniu na drzewie powstają rany, tworzące furtkę dla grzybów i bakterii, zatem należy ciąć w odpowiednim terminie i umiejętnie zabezpieczać miejsca cięcia.

\*pierwsze cięcie formujące wykonujemy na wiosnę.